

## **Apostila de Matemática Básica**

**Assunto:**

# **MATEMÁTICA BÁSICA**

**Coleção Fundamental - volume 5/8**

logo

$$|z_1 + z_2|^2 = z_1 z_1^* + [z_1 z_2^* + (z_1 z_2^*)^*] + z_2 z_2^* = |z_1|^2 + [z_1 z_2^* + (z_1 z_2^*)^*] + |z_2|^2$$

porém

$$z_1 z_2^* + (z_1 z_2^*)^* = 2 \operatorname{Re}(z_1 z_2^*) \leq 2|z_1 z_2^*| = 2|z_1||z_2|$$

de modo que

$$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2$$

ou

$$|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

Uma consequência imediata da desigualdade do triângulo é que

$$\boxed{|z_1 + z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|} \quad (89)$$

que pode ser demonstrada a partir de

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) + (-z_2)| \leq |z_1 + z_2| + |-z_2|,$$

o que nos leva a

$$\boxed{|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|} \quad (90)$$

que é a desigualdade (89) quando  $|z_1| \geq |z_2|$ . Se tivermos  $|z_1| < |z_2|$ , basta trocar  $z_1$  e  $z_2$  na desigualdade (90) para obter

$$|z_1 + z_2| \geq -(|z_1| - |z_2|)$$

que é o resultado desejado.

A desigualdade (89) traduz o fato de que o comprimento de um todo de um triângulo não pode ser menor que a diferença dos comprimentos dos outros dois lados.

Podemos também obter formas alternativas úteis para as desigualdades (88) e (89) trocando  $z_2$  por  $-z_2$ :

$$\boxed{|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|} \quad (91)$$

$$\boxed{|z_1 - z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|} \quad (92)$$

### Exemplo 1.28

Verificar a desigualdade do triângulo para  $z_1 = 2 - j3$  e  $z_2 = -4 + j$ .

#### Solução:

Temos que:

$$z_1 + z_2 = (2 - 4) + j[(-3) + 1] = -2 - j2 \rightarrow |z_1 + z_2| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2} \cong 2,82$$

$$z_1 = 2 - j3 \rightarrow |z_1| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13} \cong 3,61$$

$$z_2 = -4 + j \rightarrow |z_2| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2} = \sqrt{17} \cong 4,12$$

$$|z_1 + z_2| = 2,82 < |z_1| + |z_2| = 7,73$$

e está verificada a desigualdade.

### 1.14.6 Curvas e Regiões no Plano Complexo

Vamos considerar agora alguns tipos importantes de curvas e regiões no plano complexo e suas representações por meio de equações e desigualdades.

#### a) Circunferência

Conforme já visto em 1.14.4.b, a distância entre os pontos do plano definidos pelos complexos  $z_1$  e  $z_2$  é  $|z_1 - z_2|$ . Segue-se então que uma circunferência  $C$  de raio  $\rho$  com centro em um ponto  $a$  (fig. 1.31) pode ser representada sob a forma

$$\boxed{|z - a| = \rho} \quad (93)$$




Fig. 1.31

Onde  $z$  é um ponto qualquer da circunferência.

### Exemplo 1.29

Identificar o lugar geométrico representado por (a)  $|z - j| = 3$ ; (b)  $|z + 2 - j3| = 4$ .

$$\text{a) } \begin{cases} a = 0 + j \rightarrow a(0,1) \\ \rho = 3 \end{cases}$$




Fig. 1.32

Trata-se pois de uma circunferência centrada em  $a(0,1)$  e raio 3.

$$\text{b) } \begin{cases} a = -2 + j3 \rightarrow a(-2,3) \\ \rho = 4 \end{cases}$$




Fig. 1.33

Temos então uma circunferência centrada em  $a(-2,3)$  e raio 4.

**b) Disco Fechado**

Em consequência do que foi visto em (a), para um disco fechado de raio  $\rho$  e centro em  $a$  temos:

$$\boxed{|z - a| \leq \rho} \quad (94)$$




Fig. 1.34

### Exemplo 1.30

Identificar o lugar geométrico representado por  $|z + 3 + j| \leq 2$ .

$$\begin{cases} a = -3 - j \rightarrow a(-3, -1) \\ \rho = 2 \end{cases}$$




Fig. 1.35

#### c) Disco Aberto

Para o disco aberto temos:

$$\boxed{|z - a| < \rho} \quad (95)$$




Fig. 1.36

**d) Exterior da Circunferência**

Semelhantemente a desigualdade

$$\boxed{|z - a| > \rho} \quad (96)$$

Representa o exterior da circunferência de raio  $\rho$  centrada em  $a$ .




Fig. 1.37

**e) Coroa Fechada**

A região entre duas circunferências concêntricas de raios  $\rho_1$  e  $\rho_2$ , sendo  $\rho_2 > \rho_1$ , pode ser representada por:

$$\boxed{\rho_1 \leq |z - a| \leq \rho_2} \quad (97)$$




Fig. 1.38

**f) Coroa Aberta**

Temos então:

$$\boxed{\rho_1 < |z - a| < \rho_2} \quad (98)$$




Fig. 1.39

**g) Circunferência Unitária**

A equação



$$\boxed{|z|=1} \quad (99)$$

representa a chamada circunferência unitária, ou seja, a circunferência de raio 1 e centro na origem, que representa papel importante na seqüência do estudo de variáveis complexas.




Fig. 1.40

#### h) Reta que une dois pontos




Fig. 1.41

Sejam  $z_1 = x_1 + jy_1$  e  $z_2 = x_2 + jy_2$  os complexos representando dois pontos quaisquer  $P_1$  e  $P_2$  do plano, conforme aparece na figura 1.41, e  $z$  o complexo representando um ponto  $P$  qualquer da reta que passa pelos dois pontos inicialmente mencionados.

Da figura em questão percebe-se que:

$$z = z_1 + \mathbf{AP}$$

Sendo  $\mathbf{AP}$  e  $\mathbf{AB}$  segmentos orientados paralelos temos:

$$\mathbf{AP} = k\mathbf{AB}$$

o que nos permite escrever:

$$z = z_1 + k\mathbf{AB}$$

No entanto,

$$\mathbf{AB} = z_2 - z_1$$

o que nos conduz a:

$$\boxed{z = z_1 + k(z_2 - z_1)} \quad (100a)$$

$$\boxed{z = (1-k)z_1 + kz_2} \quad (100a)$$

Se queremos representar qualquer ponto da reta devemos ter  $-\infty < k < \infty$  mas, se queremos representar apenas os pontos do segmento que une os pontos  $P_1$  e  $P_2$  devemos ter  $0 \leq k \leq 1$ .

### 1.15. Exercícios Propostos sobre Números Complexos

1. Determine  $x \in \mathbb{R}$  para que o número complexo  $(3x+2) - j(x-1)$  seja real.
2. Determine os valores reais de  $\underline{a}$  para os quais  $(a+j)^4$  é um número real.
3. Efetuar as seguintes potências:
  - a)  $j^{12}$
  - b)  $(-j)^{76}$
  - c)  $j^{77}$
  - d)  $j^{2n} (n \in \mathbb{N}^*)$
  - e)  $j^{4n+3} (n \in \mathbb{N}^*)$

f)  $j^{2n+1} (n \in \mathbb{N}^*)$

4. Calcular  $j^0 \cdot j^1 \cdot j^2 \cdot j^3 \dots j^{30}$ .

5. Calcule o módulo e o argumento dos seguintes números complexos:

a)  $z_1 = 1 + j$

b)  $z_2 = j2$

c)  $z_3 = 3$

d)  $z_4 = 1 + j\sqrt{3}$

e)  $z_5 = -j3$

f)  $z_6 = \sqrt{3} - j$

6. Expressar cada um dos seguintes números complexos na forma polar:

a)  $15e^{j\pi/4}$

b)  $5e^{-j2\pi/3}$

c)  $10e^{-j5\pi/6}$

7. Passar os seguintes números complexos da forma polar para a forma retangular:

a)  $12,3 \angle 30^\circ$

b)  $25 \angle -45^\circ$

c)  $86 \angle -115^\circ$

8. Escrever na forma trigonométrica os seguintes números complexos e representá-los no plano de Argand-Gauss:

a)  $1 + j$

b)  $-5$

c)  $-2 + j2$

9. Determinar  $x$  e  $y \in \mathbb{R}$  de modo que  $(2x + j4y) - (x - jy) = 7 + j10$ .

10. Determine  $x$  e  $y \in \mathbb{R}$  tais que  $j^{250} + j^{104} + 2j^{37} = x + jy$ .

11. Calcule o valor de  $n$  sabendo-se que  $(2j)^n + (1+j)^{2n} = -16j$ .

12. Calcular

a)  $(1-j3)^2 + (-1-j)(2+j4)$

b)  $(2-j3) + (5+j3)$

c)  $\left(\frac{1}{2} + j\right) + \left(\frac{2}{3} - j3\right) + j^3 - j^2$

d)  $(1-j)^3$

e)  $(-4\sqrt{3} + j4)(\sqrt{3} + j)$

f)  $(\sqrt{2} - j\sqrt{3})(\sqrt{2} + j\sqrt{3})$

g)  $j(3+j5)$

h)  $(7-j8)(1+j)$

13. Se  $z_1 = 5e^{j\pi/2}$  e  $z_2 = 2e^{-j\pi/4}$  calcular  $z_1 \cdot z_2$ .

14. Calcular os seguintes produtos:

a)  $(3 \angle 20^\circ) (2 \angle -45^\circ)$

b)  $(23,5 + j8,55)(4,53 - j2,11)$

15. Sendo  $z = 2,5e^{-j\pi/3}$  calcular  $z \cdot z^*$ .

16. Sendo  $z = 10 \angle -40^\circ$  calcular  $z \cdot z^*$ .

17. Expressar na forma polar os seguintes complexos:

a)  $-4e^{j5\pi/6}$

b)  $-18e^{-j3\pi/2}$

18. Calcular:

a)  $\frac{1+j}{j} + \frac{j}{1+j}$

b)  $\frac{2}{1+j}$

c)  $\frac{1+j}{1-j}$

d)  $\frac{4+j\sqrt{2}}{2-j\sqrt{2}}$

e)  $\frac{-8j}{3+j5}$

f)  $\frac{1+j}{j} - \frac{j}{1-j}$

g)  $\frac{(3+j2)(6-j4)}{(-1+j3)j2}$

h)  $\frac{3+j}{2+j} + \frac{3-j2}{3-j}$

19. Determinar o número real  $x$  tal que o produto  $z_1 \cdot z_2$ , onde  $z_1 = 4 + j3$  e  $z_2 = x - j6$ , seja também um número real.

20. Determine o número complexo  $z$  tal que  $z^2 = 2zj$ .

21. Determine  $a \in \mathbb{R}$  para que  $\frac{-9 + ja}{2 + j3}$  seja imaginário puro.

22. Determinar o resultado da expressão  $z = \frac{z_1 \cdot z_2}{z_1 + z_2}$  sendo  $z_1 = 10 + j3,95$  e  $z_2 = 5 + j15,7$ .

23. Sendo  $z_1$  e  $z_2$  dois números complexos, resolver o sistema  $\begin{cases} z_1 + z_2 = 4 + j \\ 2z_1 - z_2 = 5 - j \end{cases}$ .

24. Calcule o argumento do complexo  $(1-j) \div (1+j)$ .

25. Sendo  $z_1 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right)$  e  $z_2 = 3 \left( \cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2} \right)$  calcular  $z_1 \cdot z_2$  apresentando o resultado na forma trigonométrica.

26. Dados  $z_1 = \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}$  e  $z_2 = 1 + j$  determine:

a)  $z_1 \cdot z_2$

- b)  $z_1 \cdot z_2^*$
- c)  $z_1^* \cdot z_2$
- d)  $(z_1 \cdot z_2)^*$
- e)  $z_1^2$
- f)  $z_2^2$
- g)  $z_1 \cdot z_1^* + z_2^*$

27. Dados  $z_1 = 1 + j2$ ,  $z_2 = -2 - j$  e  $z_3 = 3 - j4$ , calcular:

- a)  $|z_1 + z_2|$
- b)  $|z_1| + |z_2|$
- c)  $\left| \frac{z_1^* - z_2^*}{z_3^*} \right|$
- d)  $|(z_1 + z_2)(z_1 + z_3)|$
- e)  $|z_1 \cdot z_2^* + z_2 \cdot z_1^*|$

28. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são  $\alpha$  e  $\beta$ . Calcule o valor do produto  $(\cos \alpha + j \operatorname{sen} \alpha)(\cos \beta + j \operatorname{sen} \beta)$ .

29. Calcular  $(1 - j)^8$ .

30. Dado o número complexo  $z = 1 + j$  calcular  $z^{20}$ .

31. Calcular  $\left( \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^7$ .

32. Calcular  $\frac{1}{(1 - j)^{20}}$ .

33. Achar o conjugado do complexo  $z^2$  onde  $z = a(\cos \alpha + j \operatorname{sen} \alpha)$ , com  $a = 2$  e  $\alpha = \frac{\pi}{8}$  rad.

34. Calcular o menor valor **natural**  $n$  para o qual  $(-\sqrt{3} + j)^n$  é um imaginário puro.

35. Calcule o valor da expressão  $\frac{(1+j)^{101} \cdot (1-j)^{50}}{(-1-j)^{100} \cdot (-1+j)^{49}}$ .

36. Calcule o resultado de  $\left(\frac{1+j}{1-j}\right)^{15}$ .

37. Dados os complexos  $u = \frac{5-j12}{5+j12}$  e  $v = 1-j$  calcule o valor de  $|u| + v^8$ .

38. Calcular as seguintes raízes e representá-las no plano complexo:

a)  $\sqrt{8+j6}$

b)  $\sqrt[3]{j}$

c)  $\sqrt[4]{1}$

d)  $\sqrt{-25}$

e)  $\sqrt[4]{-1}$

f)  $\sqrt[3]{-128}$

g)  $\sqrt[6]{-1}$

h)  $\sqrt{1-j\sqrt{3}}$

i)  $\sqrt[3]{1+j}$

39. Determinar o conjunto-solução em  $\mathbb{C}$  para cada uma das seguintes equações:

a)  $w^2 + 1 = 0$

b)  $w^3 + 1 = 0$

c)  $w^4 + 1 = 0$

d)  $w^2 + j = 0$

e)  $w^2 + w + 1 = 0$

f)  $w^2 - 4w + 53 = 0$

g)  $w^2 + (j-2)w + (3-j) = 0$

h)  $w^4 - 3w^2 + 2 = 0$

i)  $w^4 + 3w^2 - 4 = 0$

j)  $w^4 - 16 = 0$

40. Demonstre, por indução matemática, a desigualdade seguinte, e interprete o resultado graficamente.

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n| \quad (n = 2, 3, \dots)$$

41. Estabelecer as equações cartesianas, identificar e traçar os gráficos dos lugares geométricos representados por:

a)  $|z + 3| = 3$

b)  $|z - j4| \leq 2$

c)  $2 \leq |z - 2| \leq 4$

d)  $z + z^* = 2$

e)  $z + z^2 = |z|^2$

f)  $z - z^* = j$

g)  $\text{Im}(z) \geq 2$

h)  $\text{Im}(z^2) \leq 2$

i)  $\text{Re}(z^2) \leq 1$

j)  $|\arg z| < 45^\circ$

k)  $-5 < \text{Re}(z) < 1$

l)  $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$

m)  $|z - 2| = |z - j2|$



$$n) \left| \frac{z+1}{z-1} \right| = 2$$

$$o) \left| \frac{z+j2}{z-j2} \right| = 3$$

$$p) \left| \frac{z+j}{z-j} \right| = 1$$

$$q) \left| \frac{z+1}{z-1} \right| = 1$$

$$r) \left| \frac{z+j6}{z-2} \right| \geq 1$$

$$s) \operatorname{Re}(z-3) \geq 0$$

$$t) \operatorname{Im}(jz-j) < 0$$

$$u) \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) > 1$$

$$v) |z-1| + |z+1| = 3$$

$$w) 0 < \operatorname{Im}\left(\frac{1}{z}\right) < 1$$

$$x) |z-j4| + |z+j4| = 10$$

$$y) z^2 + (z^*)^2 = 2$$

$$z) z = \alpha z_1 + \beta z_2, \text{ sendo } z_1 \text{ e } z_2 \text{ números complexos quaisquer, } \alpha \text{ e } \beta \text{ reais e não negativos e } \alpha + \beta = 1.$$

### 1.16. Resposta dos Exercícios Propostos sobre Números Complexos:

1.  $x=1$

2.  $0; 1 \text{ e } -1$

3. a)  $1$ ; b)  $1$ ; c)  $j$ ; d)  $1$  para  $n$  par e  $-1$  para  $n$  ímpar; e)  $-j$ ; f)  $j$  par  $n$  par e  $-j$  para  $n$  ímpar.


4.  $j$

5. a)  $1,414 e^{45^\circ}$ ; b)  $2 e^{90^\circ}$ ; c)  $3 e^0$ ; d)  $2 e^{60^\circ}$ ; e)  $3 e^{-90^\circ}$ ; f)  $2 e^{-30^\circ}$ .


6. a)  $15 \angle 45^\circ$ ; b)  $5 \angle -120^\circ$ ; c)  $10 \angle -150^\circ$

7. a)  $10,65 + j6,15$ ; b)  $17,7 - j17,7$ ; c)  $-36,3 - j77,9$


8. a)  $z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right)$



b)  $z = 5(\cos \pi + j \sin \pi)$



c)  $z = -2 + j2$



9.  $x = 7, y = 2$

10.  $x = 0, y = 2$

11.  $n = 3$

12. a)  $-6 - j12$ ; b) 7; c)  $2,167 - j3$ ; d)  $-2 - j2$ ; e)  $-16$ ; f) 5; g)  $-5 + j3$ ; h)  $15 - j$

13.  $10e^{j\pi/4}$

14. a)  $6 \angle -25^\circ$ ; b)  $124,5 - j10,86 = 125 \angle -5^\circ$

15. 6,25

16. 100

17. a)  $4 \angle -30^\circ$ ; b)  $18 \angle -90^\circ$

18. a)  $1,5 - j0,5$ ; b)  $1 - j$ ; c)  $j$ ; d)  $1 + j1,414$ ;

e)  $-1,176 - j0,117$ ; f)  $1,5 - j1,5$ ; g)  $-3,9 + j1,3$ ; h)  $2,5 - j0,5$ .

19.  $x = 8$

20.  $0 e^{j2}$

21.  $a = 6$

22.  $7,17 \angle 41,3^\circ = 5,39 + j4,73$

23.  $z_1 = 3$  e  $z_2 = 1 + j$

24.  $-\pi/2$  rad

25.  $6 \left( \cos \frac{3\pi}{4} + j \text{sen} \frac{3\pi}{4} \right)$